

MOEDER WORDEN ONDANKS SPONDYLITIS ANKYLOSANS?

STUDIE OVER BABY'S EN PEUTERS TOONT AAN: NAKOMELINGEN ONTWIKKELEN ZICH NORMAAL

PERSBERICHT VAN DE EUROPESE LIGA TEGEN REUMA (EULAR) OVER DE CONGRESBIJDRAGE "GROWTH AND DEVELOPMENT OF CHILDREN FROM MOTHERS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS" DOOR SUNG HAE CHANG, IN AH CHOI, JIHYOUN KIM, SUNG WON LEE, HYUN JUNG KIM EN HYEONG SIK AHN OP HET EULAR CONGRES 2020.


Vrouwen met spondylitis ankylosans kunnen kinderen krijgen ondanks hun reumatische ziekte. Maar hoe ontwikkelen die kinderen zich? Een Zuid-Koreaanse studie kwam tot de bevinding dat de baby's en peuters van moeders met spondylitis ankylosans niet verschillen in groei en ontwikkeling van de nakomelingen van andere moeders.

De Zuid-Koreaanse studie onderzocht de vraag of de ziekte spondylitis ankylosans invloed heeft op de groei en ontwikkeling van hun kinderen in de eerste levensjaren. Het team geleid door Sung Hae Chang van het Soonchunhyang University College of Medicine in Cheonan (Zuid-Korea) analyseerde gegevens van twee Zuid-Koreaanse databanken beheerd door de nationale ziekteverzekeringdienst (NHIS): het Nationale Gezondheid Screening Programma voor Kinderen, dat groei- en ontwikkelingsgerelateerde gegevens registreert voor alle kinderen, en de NHIS-databank, die de volledige gezondheidsgerelateerde gegevens van de bevolking bewaakt.

Een chronische ziekte zoals spondylitis ankylosans is geen belemmering voor vrouwen om gezonde kinderen te krijgen.

In de studie werden alle kinderen opgenomen die geboren waren tussen 2008 en 2013, die elk drie keer werden onderzocht. Het eerste onderzoek vond plaats op de leeftijd van vier tot zes maanden, het tweede tussen negen en twaalf maanden en het derde tussen 4,5 en 6 jaar.

'In totaal hebben we de gegevens van 794.544 kinderen geanalyseerd' verklaart de hoofdauteur van de studie, Sung Hae Chang. Dit ging over 369 kinderen van spondylitis ankylosans patiënten. Van deze moeders waren er 124 gediagnosticeerd met spondylitis ankylosans voordat de kinderen geboren waren. Bij de overige 245 gevallen werd de ziekte pas na de geboorte vastgesteld.



Uit de studie blijkt dat de groei en ontwikkeling van kinderen geboren uit moeders met spondylitis ankylosans vergelijkbaar waren met die van kinderen van andere vrouwen. En hoewel voor moeders bij wie spondylitis ankylosans was vastgesteld vóór de zwangerschap er meer kans was op een baby met ondergewicht dan bij vrouwen bij wie de diagnose kwam na de geboorte van hun kind, ontwikkelden hun nakomelingen zich over een periode tot 6 jaar na de geboorte in grote mate vergelijkbaar.

"Een chronische ziekte zoals spondylitis ankylosans is dus geen belemmering voor vrouwen om gezonde kinderen te krijgen," zegt Professor Dr. Med. John Isaacs van de Newcastle University in het Verenigd Koninkrijk. Deze professor adviseert echter vrouwen met spondylitis ankylosans die kinderen willen om bij een geplande zwangerschap voorafgaand advies te vragen in een consult met hun reumatoloog.

Overgenomen uit het ledenblad van onze Duitse zustervereniging: Morbus Bechterew Journal Nr 168 (Maart 2022)